

Số: 178 /UBND
Về việc phòng trừ sâu bệnh giai đoạn lúa
làm đòng vụ hè thu 2022

Cẩm Lạc, ngày 04 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Trưởng thôn 10 thôn

Lúa Hè Thu 2022 đang trong giai đoạn đòng già – trở bông, dự kiến trở tập trung từ ngày 5-10/8. Qua kiểm tra đòng ruộng trên địa bàn 10 thôn đã phát hiện các đối tượng sâu bệnh như khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, đốm nâu, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa, có nguy cơ làm giảm năng suất lúa cuối vụ. Để đảm bảo an toàn cho lúa Hè Thu 2022, Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ các đối tượng sâu bệnh như sau:

1. Bệnh lem lép hạt do nấm: Lúa thời kỳ trở thường bị tấn công bởi các loại nấm gây hiện tượng lem lép hạt và đốm nâu trên hạt, cách phun phòng trừ theo quy trình kỹ thuật như sau: Phun lần 1 khi lúa trở về (trở 3-5%), phun lặp lại lần 2 khi lúa trở thoát hoàn toàn bằng một trong các loại thuốc sau:

- + Tilt super 300EC pha 10ml thuốc vào bình 18 lít nước, phun 1.5 bình/sào;
- + Nevo 330EC pha 10ml thuốc vào bình 18 lít nước, phun 1.5 bình/sào;
- + Nativo 40WG pha 7.5g thuốc vào bình 18 lít, phun 1.5 bình/sào;
- + Vivil 5SC pha 20ml thuốc vào bình 18 lít nước, phun 2 bình/sào;.....

2. Bệnh khô vằn: Bệnh khô vằn đã phát sinh gây hại rất nặng trên lúa với tỷ lệ trung bình 5-10%, nơi cao 30-50%. Thời tiết nắng nóng, xen kẽ mưa rào và giông là điều kiện thuận lợi cho bệnh khô vằn phát sinh, lây lan diện rộng trên lúa, lúa nhiễm bệnh khô vằn rất dễ bị đổ ngã làm giảm năng suất và tăng chi phí thu hoạch, phun trừ bằng các loại thuốc sau:

- + Tilt super 300EC pha 10ml thuốc vào bình 18 lít nước, phun 1.5 bình/sào;
- + Nevo 330EC pha 10ml thuốc vào bình 18 lít nước, phun 1.5 bình/sào;
- + Vida 5WP pha 25g thuốc vào bình 18 lít nước, phun 2 bình/sào;
- + Vivil 5SC pha 20ml thuốc vào bình 18 lít nước, phun 2 bình/sào;.....

3. Bệnh đốm nâu: Bệnh đốm nâu xuất hiện trên các diện tích cao cạn, kết hợp phun thêm phân bón qua lá như Antonic 1.8SL, Comcat 150WP....; lúa bắt đầu trở về phun Tilt super 300EC, Nevo 330EC (liều lượng như sử dụng cho bệnh khô vằn).

***Lưu ý:** Đối với các trà lúa có biểu hiện thiếu dinh dưỡng thì bón bổ sung phân bón với lượng 1-2kg đạm + 2kg kali/sào,

2. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Hiện nay rầy phổ biến tuổi 4, tuổi 5, gôl lúa, mật độ trung bình 50-150 con/m², nơi cao 500-750con/m², dự báo rầy tích lũy mật độ

cao từ 10-15/8/2022, có khả năng gây cháy cục bộ thời kỳ lúa ngâm sữa, chắc xanh. Để giảm thiểu ảnh hưởng của rầy hướng dân nông dân kiểm tra đồng ruộng, tiến hành phun trừ khi mật rầy từ 750con/m² trở lên bằng các loại thuốc sau:

- + Chess 50WG: Pha 7.5g thuốc vào bình 18 lít, phun 1.5 bình/sào;
- + LED 70WP: Pha 7.5g thuốc vào bình 18 lít, phun 1.5 bình/sào;
- + Palano 600WP: ph gói 7.5g vào bình 18 lít, phun 1.5 bình/sào;
- + Aplau Bas 27WP pha 15g thuốc vào bình 18 lít, phun 1.5 bình/sào;....

Nhận được công văn đề nghị các đồng chí trưởng thôn thông báo nhân dân chủ động kiểm tra đồng ruộng và hướng dẫn người dân biết thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH**

Võ Kim Diệp